

## HARiS -2016年愛滋病預防項目指標調查-男男性接觸者

### 背景

男男性接觸者新感染愛滋病病毒個案在香港持續佔有相當比例。為監察愛滋病病毒疫情和策劃預防工作，男男性接觸者已被列入"愛滋病預防項目指標調查"的高危社群之一。

本調查目的是要建立一個以社區為基礎的行為調查，以收集高危社群的愛滋病相關風險行為和測試行為的統一指標數據，隨時間追蹤及評估本港愛滋病健康推廣和監測計劃的覆蓋率和成效。

第四次的"愛滋病預防項目指標調查"在2016年委託香港中文大學何鴻燊防治傳染病研究中心進行。

### 方法

參加者在2016年3月至6月通過8間非政府機構的自願性愛滋病病毒測試服務中心和5個非政府機構的外展服務招募。任何男性曾經和另一名男性進行口交或肛交均符合該調查的參加資格。參加者會被邀請填寫一份調查問卷。另外，4間合作機構亦提供網上問卷，在他們進行網上外展工作時邀請合資格人士參與。

### 結果

#### 1. 受訪者基本人口統計資料

8間非政府機構共訪問了1 989名男男性接觸者（非政府機構的服務中心: 1 092名; 外展: 234名; 網上: 663名）。受訪者當中98.2%是華人，79.1%年齡介乎20至39歲。1 707個（85.8%）受訪前六個月內於香港居住滿三個月或以上。

#### 2. 性行為及安全套的使用

有47.2%，39.4%和48.1%的受訪者表示在受訪前六個月內曾經分別與有感情關係的伴侶、固定性伴侶和非固定性伴侶進行肛交。而最後一次肛交的安全套使用率分別為59.9%，70.5%和79.9%。只有9.7%的受訪者在過去六個月內曾經和男性性工作者進行肛交，而最後一次肛交的安全套使用率為89.1%。

#### 3. 愛滋病病毒測試

在1 989受訪者當中，1 507人（75.8%）曾接受愛滋病病毒測試，而當中1 474人（97.8%）知道自己最近一次的測試結果。但只有1 164人（58.5%）在受訪前一年曾接受愛滋病病毒測試，當中1 144人（57.5%）知道最近一次的測試結果。這次調查中，非政府組織是最多受訪者接受測試的地方（佔66.4%）。其次是公營醫療服務（13.1%）（包括社會衛生科診所、公立醫院/診所及九龍灣健康中心）和私營醫療服務（10%）。

#### 4. 藥物及酒精使用

受訪者當中，有 22.7% 和 10.7% 曾在過去六個月在性行為以前或正在進行期間使用酒精和藥物。其中芳香劑(Poppers) 最為常見(62.3%)，其次為勃起功能障礙藥物(47.6%)及冰毒(32.5%)。

#### 分析

1. 在過去 6 個月內曾與有感情關係性伴侶肛交時使用安全套的比率只有 59.9%，較年前 HARiS 的結果輕微下跌。與男性性工作者最近一次進行肛交時使用安全套的比率由 2015 年的 96.1% 下跌至 2016 年的 89.1%。與固定及非固定性伴侶最近一次進行肛交時使用安全套的比率維持相若。因此，有需要加強向社群提倡與所有類型性伴侶進行性行為時都要持續使用安全套的信息，以助有效控制疫情。
2. 曾接受愛滋病病毒測試(75.8%)和一年內進行測試(58.5%)的比率較 2015 年調查分別所得的 78.5% 和 60.8% 稍為下跌。因此，需加強對所有男男性接觸者社群宣傳，無論有否高風險性行為，均需每年接受測試。

---

HARiS -2016年度愛滋病預防項目指標調查-男男性接觸者資料頁  
由衛生署衛生防護中心  
特別預防計劃出版  
電話：3143 7225 傳真：2780 9580  
網址：<http://www.aids.gov.hk> 電郵：[aids@dh.gov.hk](mailto:aids@dh.gov.hk)  
二零一七年五月