

## HARiS -愛滋病預防項目指標調查2017-女性性工作者顧客

### 背景

對高危社群進行愛滋病風險行為監測是愛滋病預防工作的重要一環，能幫助了解不同社群的風險行為和評估現行預防政策的成效。為更了解女性性工作者顧客的愛滋病感染風險，這社群從 2013 年起已被納入"愛滋病預防項目指標調查"的高危社群之一。這調查在 2017 年通過委託香港中文大學何鴻燊防治傳染病研究中心再次進行。

本調查目的是要建立一個以社區為基礎的行為調查，以收集高危社群的愛滋病相關風險行為和測試行為的統一指標數據，隨時間追蹤及評估本港愛滋病健康推廣和監測計劃的覆蓋率和成效。

### 方法

調查在 2017 年 4 月至 6 月期間通過 4 個非政府機構的愛滋病病毒感染自願性輔導及檢測服務中心和 1 個非政府組織在工地外展活動招募參加者。調查對象為任何在過去一年曾經接受女性性工作者服務的男性。

### 結果

#### 1. 受訪者基本人口統計資料

本調查共訪問 327 名女性性工作者顧客 (中心: 247 名; 外展: 80 名)。他們大部份(94.5%)在調查期前的六個月內居住於香港至少三個月。差不多所有受訪者都是華人 (98.2%)，接近三份一 (30.6%) 的受訪者是已婚人仕，71.9%的年齡為 40 歲以下。

#### 2. 與女性性工作者的性行為及安全套的使用

在327名受訪者當中，有298 (91.1%)人表示在調查期之前的六個月內曾經和女性性工作者發生性行為。當中78.3% 和 18.3%的受訪者表示最近的一次和女性性工作者發生性行為的地方分別是香港和中國內地(包括澳門)。最多受訪者最近一次接受性服務的地點是在一樓一場所(55.7%)，其次是按摩場所 (包括提供全身按摩的骨場、足浴店、指壓等) (18.9%)，再其次是夜總會/卡拉OK (10.4%)。84.1%受訪者表示最近一次和女性性工作者發生性行為時有使用安全套。

#### 3. 與其他性伴侶的性行為及安全套的使用

52.6%的受訪者在受訪前12個月內曾與固定性伴侶進行陰道性行為，絕大部份都是發生在香港境內 (91.9%)，而對上一次性行為的安全套使用率為61.0%。接近一半 (45.3%)受訪者表示在過去1年內曾與非固定性伴侶發生性行為，大部份 (81.1%) 是發生在香港境內，而對上一次性行為的安全套使用率為 76.4%。

#### 4. 愛滋病病毒測試

在327名受訪者當中，203的受訪者 (62.1%) 曾接受愛滋病病毒測試，當中123人(37.6%) 知道自己最近的測試結果。但只有142 (43.4%)曾在調查期之前一年內進行愛滋病病毒測試和91人(27.8%)知道自己最近的測試結果。當中佔最高比例的測試地點為非政府機構的自願性愛滋病病毒感染輔導及檢測(41.9%)，其次是私家醫生/醫院(14.3%)，再其次是衛生署社會衛生科診所(11.1%)。

#### 分析

1. 本調查顯示，大約五分之一的受訪者(18.3%)在調查期之前的六個月內曾在內地光顧女性性工作者，數字比2014年的HARiS研究結果41.3%及2015年的34.4%為少。由於跨境性活動和內地鄰近城市的愛滋病病毒感染情況可影響本地疫情，有關情況必需繼續作密切監測。
2. 女性性工作者顧客社群有機會成為女性性工作者及一般人口之間的愛滋病病毒傳播橋樑。2017年最近一次和女性性工作者發生性行為時有使用安全套的比率(84.1%)，較2015年(81.5%)稍高。此外，與固定性伴侶和非固定性伴侶持續使用安全套的比率仍然偏低，分別為61.0%和76.4%，因此，應持續推廣與任何類型性伴侶都應使用安全套的信息。
3. 曾進行愛滋病病毒測試比率(62.1%)及過去十二個月內曾進行愛滋病病毒測試的比率(43.4%)，較2015年的數字(分別為53.1%和36.5%)為高，但與其他高風險社群相比仍然較低。這顯示接受愛滋病病毒測試的意識在女性性工作者顧客中尚未普及，今後的預防工作應加強推廣愛滋病病毒測試的項目。